

Agaricus bernardi Quélet in Cooke & Quélet
[= *Agaricus maleolens* F.H. Møller]

Luogo e data del ritrovamento: Aiuola nel parcheggio scuola Pizzigoni, 20/10/25

Habitat: terreno nudo sotto siepe
diffusione: * **frequenza:** * **Commestibilità:** Non Commestibile

Caratteri da evidenziare: Cappello carnoso con superficie bianca, bianco grigiastra o di un ocra chiaro, talora screpolata in areole, vellutata al tocco, di forma inizialmente globosa poi emisferica, con margine involuto anche in esemplari adulti; gambo robusto, cilindrico o ventricoso con base attenuata o anche appuntita, munito in zona mediana di anello infero, semplice e sottile; carne soda, bianca, rossastra al taglio, con odore sgradevole di pesce marcescente o di muffa; crescita gregaria, più tipica in aree costiere, ma non rara anche in aree urbane, e in tal caso in passato indicato come *Agaricus maleolens*.

Riferimenti bibliografici:

1) Atlante fotografico dei Funghi d'Italia, Vol.1, p.366 (C. Papetti, G. Consiglio e G. Simonini).
2) AGARICUS L. from European mediterranean countries, p.52 (A. Cappelli e L.A. Parra). Candusso Editrice.